

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
1	اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل	49/7%	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	42 روز	0/5 لیتر در هکتار	92/3/27
					زنگ رزد	گندم	42 روز	0/5 لیتر در هکتار	96/6/27
					سفیدک پودری	چغندر قند		0/5 لیتر در هکتار	97/7/16
2	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	32/5%	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه گلخانه	خيار: 2 روز گوچه فرنگی: 2 روز	مزرعه: یک لیتر در هکتار گلخانه: 0/75 در هزار	88/9/30
					لکه برگی سروکسپورایی	چغندر قند		یک لیتر در هکتار	99/10/22
3	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	32/5%	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خيار گلخانه	-	0/75 در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	97/7/16
4	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	32/5%	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خيار گلخانه	-	0/75 در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	97/7/16

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

92/8/27	0/75 لیتر در هکتار	35 روز	گندم	زنگ زرد	سینجنتا	SC	28%	آمیستاراکسترا	آزوکسی استروبین+ سپیروکونازول	5
92/8/27	0/6 لیتر در هکتار	30 روز	گندم	زنگ زرد	بایرا گ	EC	46%	فالکن	اسپیروکسامین+ تبو کونازول+ تریادیمنول	6
94/3/25	0/0-7/8 لیتر در هکتار	30 روز	گندم	فوزاریوم سنبله						
94/6/23	3 کیلو گرم در هکتار	5 روز	خیار	سفیدک داخلی	اگریا	WP	43/95%	کوپروسیت سی	اکسی کلرور مس+ سیمو کسانیل	7
99/11/6	2 در هزار		گردو	آنتراکتوز	رها اندیش کاوان	WG	45%	ردشیلد	اکسید مس	8
91/6/20	1 در هزار	15 روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	75%	نوردوکس	اکسید مس	9
90/4/13	2/5 در هزار	15 روز	هلو	پیچیدگی برگ						
94/7/6	1 کیلوگرم در هکتار	15 روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی						
96/4/19	130 گرم برای یکصد کیلوگرم بنر	-----	برنج	پوسیدگی طوقه و ریشه برنج						

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

97/10/17	0/7 در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	1 روز	خيار(فضای باز و گلخانه)	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	SC	52/5%	اوروگو	آمتوکنرادین+ دیمتومورف	10
99/2/8	0/7 در هزار در فواصل زمانی 7-10 روز جهت کنترل بیماری	1 روز	هندوانه							
99/4/30	یک در هزار در هزار در فواصل زمانی 7-10 روز جهت کنترل بیماری	1 روز	انگور							
86/10/10	2% وزن غده	-----	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	50%	رورال	ایپرودیون	11
99/4/30	4 لیتر به ازای 1000 کیلوگرم غده بنری	---	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	پاک سم ایرانیان (Jiangsu) (Lanfeng	SC	26%	رستاپ	ایپرودیون 175 + کاربندازیم 85 (گرم /لیتر)	12
96/3/1	1/25 لیتر در هکتار	14 روز	برنج	بلاست	نیهون نو هیاکو	EC	40%	فوجی وان	ایزوپروتیولون	13

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

92/4/17	0/0-5/75 کیلوگرم در هکتار	1 روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	40%	بلکیوت	ایمنو کتادین تریس	14
93/3/12	750 گرم در هکتار	7 روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)						
95/8/24	0/75 در هزار	7 روز	انگور	سفیدک پودری						
93/12/4	10 در هزار دو مرحله	7 روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پردیس	SC	18%	میشو بردوکس	بردو	15
94/10/7	2 درصد محلول پاشی توأم با پانسما شانکر با بردو کیمیا 8 درصد	7 روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاش کیمیا کرمان	SC	18%	بردو کیمیا	بردو	16
96/11/16	10 در هزار	7 روز	زردآلو	غربالی	البرز بهسم	SC	18%	بردو بهسم	بردو	17
96/2/25	8 در هزار در مرحله جوانه و 5 در هزار در مرحله 5 درصد، 50 درصد و 100 درصد گل	7 روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	18%	بردو سیف	بردو	18
97/9/26	5 در هزار		خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	سبزآور نگین فلات	SC	18%	بردو سیف		

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

98/3/27	8 در هزار		هلو	پیچیدگی برگ	سبزآور نگین فلات	SC	18%	بردوسیف		
96/3/1	8-5 در هزار در زمان ریزش برگ‌ها در پاییز و تورم جوانه‌ها در بهار	7 روز	هلو	پیچیدگی برگ	سمیران	SC	20%	بردو سمیران	بردو	19
97/9/26	5 در هزار	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	اکسین شیمی آدان	SC	20%	بردوکسین	بردو	20
97/9/26	5 در هزار	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	پرتونار	SC	20%	بردوتکس	بردو	21
98/3/27	9 در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	20%	بردوتکس		
97/3/28	5 در هزار	7 روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس	بردو	22
97/8/14	10 در هزار در مرحله جوانه و 4 در هزار در مراحا 5، 50 و 100 درصد گل	7 روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس		
98/3/27	2/5 در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	باغبان تاک	SC	80%	سولفیکس		
98/3/27	10 در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس		
97/9/26	5 در هزار	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	18%	بردوفیکس		
97/12/13	9 در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	20%	بردوجی	بردو	23
99/4/30	15 در هزار	-	زردالو	غربالی	فرآورده‌های طیف	SC	18%	بردوطیف	بردو	24

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

					سبز					
25	بردومیکسچر (CU) +15% فوزتیل آلومینیوم 18%	توتور	33%	WP	خزرسم کود ()	سفیدک کرکی	خیار	7 روز	3 کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	99/6/24
26	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	یونیلیس	38%	WG	بازرگانان سرای سپند پارس) Shandong (Kangqiao	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	-	یک در هزار (حداکثر دو بار در سال)	98/10/23
27	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	بلیس	38%	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	7 روز	0/7 در هزار مناطق خشک، 1 در هزار مناطق مرطوب	89/9/29
28	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	بلیس	38%	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب درختی	-	7/ در هزار و در تناوب با سایر قارچ کش- ها و حداکثر دوبار در سال	97/12/13
						آلرناریا	پودری گوجه فرنگی	3 روز	0/5 کیلوگرم در هکتار	94/12/10
						آلرناریا	سیب زمینی	3 روز	0/5 کیلوگرم در هکتار	95/3/17

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

98/11/28	1/5 در هزار و در تناوب با سایر قارچ کش- ها و حداکثر دوبار در سال	3 روز	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	33/4%	سیگنوم	بوسکالید+ بپراکلوستروبین	29
99/3/12	1/5 کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله 14 روز تا برداشت استفاده شود.	3 روز	کاهو	افتادگی برگ						
89/9/29	0/5 در هزار	7 روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	30%	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	30
96/9/13	0/4 در هزار	-	خیار							
98/4/10	0/5 در هزار	-	گوجه فرنگی (فضای باز)							
90/12/1	5 در هزار	-	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیاسبز اور	SP	85%	کالیبان	بی کربنات پتاسیم	31
97/12/13	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی (آستک)	EC	25%	بهتیل	پروپیکونازول	32
99/6/24	400 میلی لیتر	21	گندم	سپتوریوز	گیاه پر نیان اطلس	EC	30%	هاربور	پروپیکونازول 15 درصد	33

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	در هکتار				Safa tarim				+ دیفنوکونازول 15 درصد	
89/3/10	10-15 میلی- لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آگ	FS	40%	لاماردور	پروتیوکونازول+ تبوکونازول	34
89/9/1	20 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار						
96/4/19	15 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو							
92/7/8	3 لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار 0/3 لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	3 روز	خیار	بوته میری	بایر آگ	SL	84%	پروپاموکارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	35	

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

92/8/27	2 در هزار	1 روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	68/75%	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	36
94/7/6	1/2 لیتر در هکتار	7 روز	سیب زمینی							
94/7/6	2/5 لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگریفار	SC	45%	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	37
96/11/30	1 در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و 0/75 در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	-	خیار	بوته میری <i>Pythiumaphniderm atum</i>	اگریفار	SL	72/2%	پروپلنت	پروپامو کارب هیدروکلراید	38
97/12/13	نیم لیتر در هکتار		گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	35/5%	اینور	پروپیکونازول+فلوکساید روکساد+پیراکلو استروبی ن	39
92/8/27	0/9 گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	50%	آکورد	پروکلراز	40
86/2/3	1/25 در هزار (ضد عفونی بذر)	-	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	25%	مونسرن	پنسیکرون	41
99/4/30	1-1/25 در هزار (ضد عفونی بذر)		سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده		FS				

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

97/10/17	0/35 در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	جیانگ سوگرین سای (برزگر برجسته)	DF	18/7%	پیرادیم	پیراکلو استروبین+ دیمتومورف	42
98/10/23	یک در هزار		گوجه فرنگی (مزرعه)	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس	WG	38%	یونیلیس	پیراکلو استروبین+ یوسکالید	43
99/3/12	1/5 لیتر در هکتار		گندم	سفیدک پودری	ب آ اس اف	EC	22/5%	پریاکسور	پیراکلو استروبین+ فلوکساپیروکساد	44
98/11/28	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ کش-ها و حداکثر دوبار در سال	-	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	گیاه پر نیان اطلس (Safa Tarim)	SC	30%	میلیس	پیری متانیل	45
94/3/11	1 لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکروتنیایی	بایر آگ	EW	25%	فولیکور	تبوکونازول	46
95/9/29	50 میلی لیتر برای یکصد کیلورم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بیستر فیلد	FS	6%	آرتمیس	تبوکونازول	47
97/12/13	یک لیتر در	-	گندم	زنگ زرد	گل سم گرگان	EW	25%	تبوکور	تبوکونازول	48

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	هکتار				(نینگ بوسانجوی)					
97/12/13	4/ لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گیاه پرنیان اطلس (تایید کراپ- ساینس)	SC	40%	تایدتیو	تبوکونازول	49
88/8/11	0/5 لیتر در هکتار در مزرعه و 0/4 در هزار در گلخانه	3 روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	10%	دومارک	تبوکونازول	50
92/3/27	0/3 در هزار	14 روز	سیب							
89/10/13	100 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	ایزاگرو	LS	12/5%	لوسپل	تبوکونازول	51
89/10/13	30 میلی لیتر برای یکصدکیلوگرم بذر	-								
98/10/23	یک در هزار		رز	سفیدک پودری	آریاشیمی (Ningbo Sunjoy + Jiangsu)	SC	32%	آذیلون	تبوکونازول+ آزوکسی استروبین	52
90/7/4	0/1-8 لیتر در	21 روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	12/5%	امی ننت	تتراکونازول	53

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	هکتار									
89/3/10	150 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	DS	7/5%	بایتان	تربادیمنول	54
89/3/10	20 میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم م بذر	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	20%	رنال	تری تیکونازول	55
88/8/11	200 گرم در هکتار	1 روز	جالیز- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	50%	فلینت	تری فلوکسی استروبین	56
96/5/2	250 گرم در هکتار	1 روز	گوجه فرنگی- مزرعه							
92/3/6	160 گرم در هکتار	21 روز	برنج	بلاست	بایر آگ	WG	75%	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	57
94/5/12	0/0-2/3 در هزار	14 روز	سیب	لکه سیاه						
95/6/1	0/3 در هزار	14 روز	سیب	سفیدک پودری						
95/6/1	200 گرم در هکتار	-	چغندر قند	سفیدک پودری						
96/9/13	160 گرم در هکتار	21 روز	برنج	شیت بلایت						

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

98/11/14	160 گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	بازرگانان سرای سپند پارس CAC) (Nantong	WG	75%	فلونازول	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	58
98/11/14	320 میلی لیتر در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان Sunjoy&) (CAC Nanton	SC	37/5%	تیلما	تری فلوکسی استروبین+ تبوکونازول	59
96/2/25	0/2 در هزار	14 روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	50%	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	60
96/3/1	0/2 در هزار	14 روز	سیب	لکه سیاه						
96/3/1	0/2 در هزار	3 روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری						
96/5/2	200 میلی لیتر در هکتار	5 روز	گوجه فرنگی- مزرعه							
99/10/9	یک در هزار	-	درختان سیب	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان (نپون سودا)	EC	15%	تریفمین	تری فلومیزول	61
99/10/1	75 صدم در هزار	14 روز	هلو	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان (نپون سودا)	WG	18/4%	پانچو تی اف	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	62
96/11/30	0/3 در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	19%	ساپرول	تریفورین	63
98/12/28	0/4 تا نیم در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	ب آ اس اف	FS	12%	اینشورپرفرم	تریتیکونازول +پیراکلو استروبین	64
80/3/21	-	-	مرکبات	انبارداری	---	WAX	0%/7	سیترازول آ	تیابندازول+ ایمزالیل	65

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

99/3/26	300 سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	21 روز	برنج	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong) (kangqiao)	SC	24%	آچمز	تیفلوزامید	66
90/3/30	0/0-5/4 کیلوگرم در هکتار	21 روز	برنج	بلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	72/5%	ویستا	تیوفانات متیل+ تری سیکلازول	67
97/6/27	500 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	SC	47/9%	رکس دو	تیوفانات متیل+ اپوکسی کونازول	68
89/3/10	200 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	3/63%	دیویدند استار	دیفنوكونازول+ سایپرو کونازول	69
89/9/1	100 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم							
97/8/14	1 در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	-	خيار در شرایط گلخانه‌ای	سفیدک پودری	سینجنتا	DC	14%	سیدلی تاپ	دیفنوكونازول+ سیفلوفنامید	70
99/10/22	نیم در هزار	3 روز	خيار در شرایط گلخانه‌ای	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	12/5%	داگونیس	دیفنوكونازول+ فلوکسایپر وکساد	71
94/12/10	2 لیتر در هکتار	3 روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	EC	11/2%	کابریو دو	دیمتومورف+ پیراکلوستروبین	72
94/8/25	2 کیلوگرم	7 روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	WG	69%	آکروبات ام زد	دیمتومورف+ مانکوزب	73

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	در هکتار									
74	سایپروکونازول+ کاربندازیم	آلتو کمبی	42%	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکروتنیایی	ساقه کلزا	-	1 لیتر در هکتار	94/3/11
75	سیازوفامید	ر انمن	40%	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	3 روز	0/0-4/5 در هزار	91/3/8
	سیازوفامید					سفیدک داخلی	سیب زمینی	-	150 میلی لیتر در هکتار	94/7/6
	سیازوفامید		10%			سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	3 روز	1/5 در هزار	96/5/2
76	سیازوفامید	رگنانت	20%	SC	شاندوگ هایلر (بازرگانان سرای سپند پارس)	سفیدک داخلی	خیار (گلخانه)	-	0/6 در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	97/10/17
77	سولفور	سولفولاک	80%	WG	بیستر فیلد	سفیدک پودری	خیار	1 روز	3 کیلوگرم در هکتار	92/4/17
78	سولفور	گوگرد سمیران	80%	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	2/5 در هزار	92/8/27
79	سولفور	سولفور ارکیده سازان	40%	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	20 روز	3/75 در هزار	93/6/10
80	سوافور	پارومی دی	80%	DF	آریا شیمی (کروماندل)	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	3 در هزار با مشاهده اولین علائم و در	99/3/12

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	تتاوب با سایر قارچ کش ها									
98/10/9	3 در هزار	-	توت فرنگی	کپک خاکستری	ر هر وان رویش سبز	SP	62/2%	سراکونینت	سولفات مس +102 فسفیت پتاسیم 519	81
97/12/13	4/کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	-	پیاز	سفیدک داخلی	خزر سم کود Zhejiang Sega	WG	52/5%	اکولایزر	فاموکسادون+ سیموکسانیل	82
99/4/9	2/5 در هزار	14 روز	انگور	سفیدک پودری	الیت ساوان AGRO OAT) (EC	5%	گاتن	فلوتیانیل	83
97/10/17	3لیتر در هکتار (در تتاوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوزاریومی	جیانگ سو (کیمیا سبزینه پویا)	SC	25%	لیانگدی	فناماکریل	84
92/12/5	2/5 در هزار	30 روز	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	80%	الیت	فوزتیل آلومینیوم	85
96/5/2	2 در هزار	14 روز	مرکبات	گموز	دوگال	WP	80%	رودر	فوزتیل آلومینیوم	86
99/10/22	2/5 در هزار	14 روز	پسته	انگومک	گل سم گرگان LiminChemical	WP	80%	فیتوکیور	فوزتیل آلومینیوم	87
95/8/24	2-2/5 در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	7 روز	انگور	سفیدک داخلی	بایر آگ	WG	71/1%	پروفابیلر	فوزتیل آلومینیوم+ فلوپیکولید	88
87/5/2	0/2 در هزار	4 روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	50%	استروبی	کروزکسیم متیل	98

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

90	کینوسول	بلتانول	37/5%	SL	پروبلت فیتو اسپانیا (سبا کوشا کشت)	بوته میری	خیار (گلخانه و فضای باز)	-	نیم در هزار	98/4/10
91	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	کاریال استار	50%	SC	سینجنتا	سفیدک داخلی	خیار (گلخانه)	1 روز	0/7 در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و 3 بیش از 4 هار نوبت 5 در یک دوه تولید ممنوع است.	97/10/17
92	مانکوزب+ کلروتالونیل+ سیمو کسانیل	آلیادو سی تی ال	65%	WP	ماسو	گموز	مرکبات	-	30 گرم در یک لیتر آب و کاربرد به روش رنگ آمیزی	93/4/2
93	مایکلوپوتانیل	آتیس	40%	WP	ناگارجونا اگری کم (سبز محصول داتیس)	لکه سیاه	سیب درختی	-	3/ در هزار) به صورت تناوبی با قارچ- کش های دیگر)	97/9/26
94	متابی سولفیت سدیم	سولفور پد	7 گرم متا بیسولفیت	پد کاغذی	اروم زرین خوشه	بیماریهای قارچی	انگور	-	یک بسته 7 گرمی برای نگهداری 5 کیلوگرم انگور	86/8/28
95	متالاکسیل+ مانکوزب	داونی جی	72%	WP	گیاه	بوته میری در مزرعه و گلخانه	خیار	7 روز	2 در هزار در مزرعه به	96/4/19

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار 200 گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک									
93/2/15	2 در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار 200 گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	7 روز	خیار	بوته میبری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	72%	رزالاکسیل	متالاکسیل+ مانکوزب	96
94/7/6	3 کیلوگرم در	7 روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی						

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

	هکتار									
99/3/12	2/5 کیلوگرم در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	کیمیا گوهر خاک (Leeds)	WP	72%	منکوماکسیل	متالاکسیل 8 درصد+ مانکوزب 64 درصد	97
99/9/17	دو در هزار	-	خیار	بوته میری	ایرمان (UPL)	WP	72%	منکولاکسیل	متالاکسیل 8 درصد+ مانکوزب 64 درصد	98
99/4/9	2/5 در هزار	-	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	پیراکشت شیمی Industrias) Quimicas (Valles	SC	22%	آر متیل آر	متالاکسیل 3/5 درصد + هیدروکسید مس 18/5 درصد	99
99/9/17	2 در هزار	-	خیار	بوته میری	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang) (Heben	GR	5%	ریدومکس	متالاکسیل	100
99/9/17	2 در هزار	-	خیار	بوته میری	گیاه Zhejiang) (Heben	GR	5%	ردوکسیل	متالاکسیل	101
95/6/29	3-4 در هزار	صفر روز	خیار - گلخانه	سفیدک داخلی	J I Biotech	SL	53%	فسفایت	مونو و دی پتاسیم اسیدفسفونیک	102

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1399

95/10/27	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار 2 در هزار	10 روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	30%	تاچی گارن	های مکسازول	103
98/4/10	1/5 لیتر در هزار لیتر آب	-	خیار (گلخانه و فضای باز)	بوته میری	سینجنتا	EC	44/6%	یونیفورم	متالاکسیل ام (مفنوکسام) + آزوکسی استروبین	104
96/8/29	مزرعه: 10 در هزار گلخانه: 7/5 در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	JH.biotech	SL	-	میلدی کیور	عصاره گیاهی	105